

VASCULARIZAÇÃO

ARTERIAL

DA


FACE

Suprimento sanguíneo da cabeça e pescoço


se deve às artérias

Artéria carótida comum

Artéria vertebral



Artéria Carótida Comum



Lado direito

Tronco

braquiocefálico

artéria subclávia e


artéria carótida

comum

Lado esquerdo

ramo do arco da

Aorta



A. Carótida Comum


Sobe no pescoço dentro da bainha carótica

Nervo vago

Veia jugular interna

FEIXE	VÁSCULO
NERVOSO DO PESCOÇO	

Artéria Carótida Comum



Ao nível da cartilagem tireóidea se bifurca em:

Artéria Carótida Externa


irriga as estruturas
externas do crânio

Artéria Carótida Interna

irriga as estruturas no interior
da cavidade craniana
e das órbitas

Artéria Carótida Interna

Penetra no crânio pelo canal carótico e termina na fossa craniana média, dividindo-se em :
Artérias cerebrais anteriores e médias









Fig. 289



Gânglio trigeminal (Semilunar ou de Gasser)




Artéria Carótida Interna

Seio Carótico

Dilatação em forma de fusão, que contém presso-receptores

Corpo carótico

Pequena estrutura que se localiza no ângulo da bifurcação da artéria C. Comum, e que contém quimiorreceptores



Ramos da Artéria Carótida Externa

Face

Anterior

Posterior

Medial

Terminal

Ramos

1. Tireóideo superior
2. Lingual
3. Facial
4. Occiptal
5. Auricular posterior
6. Faríngeo ascendente
7. Temporal superficial
8. Maxilar

A. tireóidea superior


Pode originar-se também da A.
C. Comum

no ápice do lobo da glândula
tireóidea divide-se nos

ramos glandulares

r. esternocleidomastóideo

a. laríngea superior




A. faríngea ascendente

Pode originar-se como um ramo da A. occipital

Ramos faríngicos

Ramos meníngicos

A. timpânica inferior



A. lingual


Origina-se ao nível ou acima do osso hióide

Trajetória em relação ao **M. hioglosso**

Posterior
ramo supra-hióideo


Profundo
ramos dorsais da língua


Anterior
A. sublingual
A. profunda da língua (terminação)




Carotid Arteries - Parotid Fossa

Right Lateral Dissection










vesi
n. hy
a. lin
glandula
ductus su

m. orbicularis or

plica sublingualis, ostia d





A. facial

Pode originar-se juntamente com a lingual - tronco linguofacial

Termina no ângulo medial do olho, anastomosando-se com ramos da artéria oftálmica

Parte cervical

A. palatina ascendente
ramo tonsilar

ramos glandulares

A. submental

A. labial inferior



A. labial superior

ramos septais e alares

ramo lateral do nariz

A. angular


Parte facial




A. facial


Parte cervical

A. palatina
ascendente
ramo tonsilar
ramos glandulares
A. submentual





A. facial



Parte facial

A. labial inferior

A. labial superior

ramos septais e alares

ramo lateral do nariz

A. angular

A. occipital

Seu trajeto pode ser considerado em três porções em relação ao M. esternocleidomastóideo:

Anterior, profunda e posterior.


ramo mastóideo

ramo auricular

ramos esternocleidomastóideos

ramos occipitais

ramo descendente



A. auricular posterior

Passa entre o meato
acústico externo e o
m. esternocleidomast
óideo

A. estilomastóidea


A. timpânica posterior

ramos mastóideos

Ramo auricular

Ramo occipital

Ramo parotídeo




A. Carótida Externa

Divide-se em seus ramos terminais
ao nível do colo da mandíbula

A. Temporal superficial

A. maxilar



A. temporal superficial

Ela irriga a glândula parótida e o ducto, a orelha e fossa temporal

Ramo parotídeo

A. transversa da face

anastomosa-se com rr da A. facial


Ramos auriculares anteriores


A. zigomático-orbital


A. temporal média

Ramo frontal

Ramo parietal









A. maxilar

É o maior ramo terminal da A. C. Externa. Distribuí-se às maxilas e mandíbula, aos músculos da mastigação, ao palato e ao nariz. O seu trajeto pode ser considerado em três partes:



A. maxilar



Mandibular

A. auricular profunda

A. timpânica anterior

A. alveolar inferior


ramos dentais



ramos peridentais



ramo milo-hióideo

ramo mental

A. meníngea média









Pterigóidea


A. maxilar


A. massetérica

A. temporal profunda anterior

A. temporal profunda posterior
ramos pterigóideos


A. bucal





A. maxilar

Pterigopalatina



A. alveolar superior posterior

ramos dentais

ramos peridentais

A. infra-orbital

Aa. alveolares sup. anter.

ramos dentais

ramos peridentais

A. do canal pterigóideo

ramo faríngeo

A. palatina descendente

A. palatina maior

Aa. palatinas menores

A. esfenopalatina

Aa. nasais post. laterais

ramos septais posteriores

PALATO DURO

